

COMO PREVENIR A INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL

1 - Registrar a indicação de permanência do CVC

- Rever diariamente a necessidade do cateter na visita multidisciplinar;
- Remover cateteres desnecessários;
- Não realizar troca pré-programada do cateter.



- Higienizar as mãos imediatamente antes do manuseio do cateter.



- Realizar desinfecção dos conectores com álcool a 70% por 5-15 segundos, antes do manuseio do cateter.

2 - Aderir a técnica asséptica no manuseio do cateter

3 - Realizar a troca do sistema de infusão de acordo com as recomendações vigentes do país

Trocar a cada 96h

- Conectores;
- Equipos de infusões contínuas;
- Equipos de monitorização hermodinâmica.

Trocar a cada 24h

- Equipos de infusões intermitentes.

Trocar a cada 12h

- Equipos e dispositivo de propofol.

- Trocar a cada bolsa de NPT os equipamentos e dispositivos.



- Trocar o curativo com filme transparente a cada sete dias ou antes se houver sujeira, descolamento da pele ou umidade.



- Em caso de diaforese ou sangramentos, realizar o curativo com gaze e cobertura estéril a cada 48 horas. Trocar antes se houver sujeira, descolamento da pele ou umidade.

4 - Aderir a técnica correta de curativo

- Proteger os curativos dos cateteres com material impermeável durante o banho.