





## COMO PREVENIR A INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO ASSOCIADA A CATETER VESICAL DE DEMORA

1 - Manter o sistema de drenagem fechado



• Coletar exame de urina pelo dispositivo.



- Utilizar sistema fechado de drenagem;
- Trocar todo o sistema auando ocorrer desconexão ou vazamento.



Manter o sistema de drenagem abaixo do nível da bexiga e à 10 cm de distância do chão.



Esvaziar a bolsa coletora quando estiver com 2/3 da sua capacidade.

2 – Executar a técnica correta durante manipulação do sistema de drenagem



- Evitar dobras do sistema;
- Fixar o cateter para não ocorrer tração ou movimentação.



Higienizar as mãos ANTES e APÓS tocar no sistema de drenagem.

3 – Realizar a higiene diária do meato uretral

- Estimular a higiene do meato uretral pelo próprio paciente;
- Em caso de impossibilidade do paciente, este procedimento deve ser feito pela equipe assistencial.
- Anotar diariamente a indicação para manutenção do cateter. Sugerir a remoção caso não haja critério para utilização;
- Solicitar para equipe médica documentar a razão da permanência do cateter.

4 - Verificar diariamente a necessidade de manter o cateter vesical



















