

# Cuidados de enfermagem com pacientes em uso de SVD




Colaborativa IHI - 2017

# Higiene das mãos

- ✓ Use água e sabão se sujidade visível nas mãos
- ✓ Use álcool gel se mãos limpas, fazendo os movimentos indicados nos passos 3 ao 9



- 1.** Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia.



- 2.** Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante)



- 3.** Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si.



- 4.** Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa) entrelaçando os dedos.



- 5.** Entrelace os dedos e fricção os espaços interdigitais.



- 6.** Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta (e vice-versa), segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem.




- 7.** Esfregue o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), utilizando movimento circular.




- 8.** Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha (e vice-versa), fazendo movimento circular.



- 9.** Esfregue o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita (e vice-versa), utilizando movimento circular.



- 10.** Enxágüe as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a torneira.




- 11.** Seque as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos.



# 1. Fixação de sonda vesical de demora

- Os cateteres vesicais de demora sempre devem estar fixados para evitar tração e movimento de entra-e-sai na uretra, que pode causar lesão e facilitar a entrada de microrganismos
- O local para fixação pode ser: inguinal, supra-púbico ou coxa
- Observar se o cateter não está esticado, dobrado ou torcido
- Rodiziar o local de fixação para evitar lesão no meato



## 2. Cuidados com a bolsa coletora de urina

- Higienizar as mãos antes e após tocar no sistema coletor
- Mantê-la longe do chão e locais contaminados
- Mantê-la abaixo do nível da bexiga para evitar refluxo
- Esvazia-la quando estiver com 2/3 de sua capacidade
- Trocar todo o sistema se observar furos ou vazamentos (trocas de rotina não são recomendadas)



### 3. Cuidados com a drenagem


- Usar frasco de drenagem individual (1 para cada paciente)
- Não permitir que o bico escoador encoste no frasco de drenagem durante o esvaziamento da bolsa
- Comunicar enfermeiro se drenagem ficar lenta ou parar
- Anotar no prontuário volume e características da urina
- Vigiar sempre o tubo coletor evitando dobras e loopings





## 4. Cuidados com a higiene corporal

- Fazer higiene da genitália durante o banho e toda vez que o paciente evacuar
- Limpar a genitália, o períneo e o cateter com sabonete neutro e pano de limpeza macio
- Vigiar sangramento, secreções e lesões no meato



Nunca se esqueça de se proteger e  
proteger os pacientes !

