

Transporte de Pacientes Suspeitos ou Confirmados da Covid-19 no Contexto de Assistência à Saúde

1. Quais cuidados devem ser tomados para programar o transporte de pacientes no ambiente intra-hospitalar?



Deve-se **minimizar o transporte dos pacientes**, priorizando a realização de exames à beira leito.



Nos casos em que o transporte se faz necessário, deve-se atentar para os seguintes aspectos:

- Realizar a avaliação clínica do paciente a fim de minimizar os riscos de intercorrências durante o transporte.
- Em caso de pacientes graves em insuficiência respiratória, considerar intubação antes do transporte.
- Idealmente, o transporte de pacientes instáveis ou em ventilação mecânica deve ser realizado por médico, enfermeiro e fisioterapeuta.
- Separar e verificar previamente os materiais necessários para o transporte (equipamentos de monitorização, medicações, suporte ventilatório).
- Comunicar o setor de destino antes de transportar o paciente para que as medidas de precaução possam ser adotadas.



Utilizar os EPIs adequados: avental de mangas longas, luvas de procedimento, óculos de proteção ou máscara facial (face shield). Nos casos de transporte de pacientes intubados, substituir a máscara cirúrgica por N95/PFF2 e acrescentar o gorro.



Realizar o transporte com apoio de outro profissional utilizando máscara e óculos de proteção ou *face shield* para apoiar na abertura e fechamento de portas e acionamento de elevadores. Esse profissional não entra no quarto/box.



Em **pacientes em ar ambiente ou em uso de cateter nasal de O₂**, colocar máscara cirúrgica nos pacientes.




Saiba mais em:
saude.gov.br

FONTE: <https://coronavirus.saude.gov.br> e <http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus>



2. Quais cuidados devem ser tomados no transporte interinstitucional de pacientes?

- ☒ Transporte somente em casos de **extrema necessidade**.
- ☒ Ter **rotas pré-definidas para movimentação hospitalar** de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19.
- ☒ Garantir **ventilação do veículo para aumentar a troca de ar** durante o transporte (ar condicionado com exaustão, que garanta as trocas de ar ou janelas abertas).
- ☒ Sempre que possível, **utilizar equipamentos de uso exclusivo para o transporte**, garantindo os insumos necessários para manter o suporte ventilatório e hemodinâmico.
- ☒ **Reduzir equipamentos e materiais não essenciais** dentro da ambulância.
- ☒ **Evitar manipulações desnecessárias** para minimizar a possibilidade de contaminação da equipe/material.
- ☒ **Comunicar o setor de destino antes de transportar o paciente** para que as medidas de precaução possam ser adotadas.
- ☒ **Utilizar os EPIs adequados:** avental de mangas longas, luvas de procedimento, óculos de proteção ou máscara facial (face shield). Nos casos de transporte de pacientes intubados, substituir a máscara cirúrgica por N95/PFF2 e acrescentar o gorro.
- ☒ **Em pacientes em ar ambiente** ou em uso de cateter nasal de O₂, **colocar máscara cirúrgica** nos pacientes.



3. Quais cuidados devem ser tomados ao transportar pacientes em ventilação mecânica?



Manter filtro HME/HMEF entre tubo endotraqueal e o ventilador e filtro HEPA adicional no ramo expiratório do ventilador mecânico



O ventilador mecânico não deve ser desconectado durante o transporte. Caso seja necessário, clampear o tubo com pinça clamp



Evitar transportar o paciente em uso de VNI

4. Quais cuidados devem ser tomados após o transportar pacientes?



Realizar limpeza e desinfecção do ambiente e dos equipamentos utilizados durante o transporte



Proceder com limpeza e desinfecção do veículo após o transporte interinstitucional de pacientes



Estabelecer o profissional responsável pela limpeza e o local específico para realizá-la



Utilizar álcool 70%, hipoclorito de sódio 0,5% ou outro desinfetante padronizado (ex: peróxido de hidrogênio, quaternário de amônio, etc.)