


ATUALIZADO
MAIO 2021

Fluxo de Manejo



Saiba mais em:
saude.gov.br

Sinais/sintomas de Síndrome Gripal (Tax>37,8°C), acompanhada de tosse e/ou dor de garganta

Isolamento domiciliar e seguimento de acordo com o Protocolo de Manejo da COVID-19

NÃO

Sinais de gravidade

- Dispneia
- SatO₂ < 95% em ar ambiente
- Desconforto respiratório
- Piora das condições clínicas de base

SIM

LEMBRAR DE

Internação

1. Notificar como SRAG e coletar RT-PCR SARS-CoV-2
2. Prescrever Oseltamivir até resultado de RT-PCR para SARS-CoV-2. Se positivo, suspender o uso
3. Avaliar necessidade de antibioticoterapia (pneumonia comunitária)

Internação em leito de terapia intensiva

- Hidratação venosa, se necessário
- Exames complementares
- Suporte intensivo em leito de isolamento privativo ou coorte
- Administre antibiótico de acordo protocolo institucional
- Administre vasopressor quando o choque persistir (PAS < 90 mmHg, PAM < 65 mmHg) durante ou após a ressuscitação volêmica

Presença de algum desses sinais/sintomas?

- Choque
- Disfunção orgânica
- Insuficiência respiratória
- Necessidade de O₂ > 5L/min
- FR>28irpm
- Retenção de CO₂ (PaCO₂ >50mmHg e/ou pH<7,25)
- Instabilidade hemodinâmica

SIM

NÃO

Internação em leito clínico

- Acompanhamento clínico em leito de isolamento privativo ou em coorte
- Hidratação venosa, se necessário
- Oxigenoterapia, se necessário e monitoração não invasivo de SatO₂
- Exames complementares

SE PIORA CLÍNICA

Sinais de insuficiência respiratória?

- Necessidade de O₂ > 15L/min via máscara com reservatório para sustentar sat O₂ > 93% e/ou
- FR>28irpm e/ou
- Retenção de CO₂ (PaCO₂ >50mmHg e/ou pH<7,25)

NÃO

SIM

Intubação orotraqueal

- Prosseguir com IOT sequência rápida
- Pré-oxigenação por 5 min com máscara com reservatório
- Ventilação mecânica protetora
- Utilizar linhas para sucção em sistema fechado e filtro HME/HMEF no circuito

Monitoração não invasiva de SatO₂ e manter suporte intensivo

ATENÇÃO

Colete culturas antes da primeira dose de antibiótico e descalone com base no resultado microbiológico ou julgamento clínico.