	Instrução de Processo		Setor	Validade	
	Realizar higiene oral				
diariamente (Higiene Oral)			Modelo		
Νº	O que fazer?	Imagem	Como fazer?		
1	Higienizar as mãos	Água e sabão Álcool gel		A) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel.	
2	Preparo para higiene oral	Angulação deve estar entre 30°a 45° Pressão de cuff deve estar de 10 a 20 cmH2O	Os itens : D) Verifica	o material para higiene oral (luva de procedimento, gaze e água destilada ou filtrada) B) Observar se o decúbito dorsal está elevado entre 30° e 45° C) Higienizar as mãos. abaixo se aplicam para pacientes intubados COM tubo orotraqueal COM balonete ar a pressão de cuff antes do procedimento ou conferir se houve registro do mesmo. necessário ajustar a pressão do cuff, higienizar as mãos novamente e calçar as luvas. F) Assegurar a correta fixação do tubo antes de iniciar a higiene bucal	

Limpeza da cavidade oral A) Realizar a inspeção da cavidade oral, observar se tem alterações; (comunicar enfermeiro ou médico); B) Embeber a gaze na água destilada ou filtrada C) enrolar a gaze no dedo indicador, introduzir na cavidade oral do récém-nascido D) realizar movimentos delicados de trás para frente em toda extensão da boca do bebê (gengiva, bochecha e língua). Troque a gaze a cada lado e face da cavidade oral higienizada. Técnica da Higiene Oral (Retirada de biofilme = Placa branca) Aspiraração da cavidade Limpeza dos tubos e sondas/ aspiração: H) Com gaze embebida na água, higienize as sondas e tubo orotraqueal. I) Pacientes secretivos: aspirar a cavidade oral, com sugador ou sonda de aspiração antes, durante e após o procedimento.

Limpeza dos tubos e sondas

4	Assegurar a qualidade da higiene oral	Aspecto de língua sem dieta ou crostas esbranquiçadas	1) Após a higiene oral, realize a inspeção da cavidade oral, observando: a) se não há resquicios de dieta ou crostas esbranquiçadas nas regiãos da cavidade oral (gengiva, língua, bochecha). 2) Considerar adequado: b)se as superfícies do tubo orotraqueal e sondas estiverem sem cobertura de placa ou biofilme esbranquiçado.
5	Finalizar Procedimento	Avaliar a posição e aderência da fixação do tubo Pressão de cuff deve estar de 10 a 20mmHg	A) Avaliar a posição e aderência da fixação do tubo Pacientes COM tubo COM balonete: realizar a mensuração do cuff após o procedimento. B) Hidratar os lábios.





