



Instrução de Processo			Setor	Validade
Higiene diária do meato uretral			Modelo	
nº	O que fazer?	Imagem	Como fazer?	
1	Higienizar as mãos	 Água e sabão  Álcool gel	A) Imediatamente antes de higienizar a superfície que servira de apoio, conforme padronizado na instituição (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel).	
2	Reunir materiais	A)  B)  Água e sabão  Álcool gel C) e D) 	A) Higienizar a superfície que servira de apoio para os materiais com produto padronizado; B) Higienizar as mãos imediatamente antes de tocar nos materiais, conforme padronizado na instituição (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel); C) Organizar todos os materiais que serão utilizados sobre a superfície de apoio; D) Deixar os materiais próximo ao paciente.	
3	Higienizar as mãos	 Água e sabão  Álcool gel	A) Imediatamente após organizar os materiais, conforme padronizado na instituição (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel)	
4	Realizar paramentação	A)  B)  Água e sabão  Álcool gel C) 	A) Coloque máscara cirúrgica e óculos de proteção; B) Higienizar as mãos conforme padronizado na instituição (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel), imediatamente antes de calçar as luvas de procedimento C) Com as mãos secas calçar as luvas de procedimento. Segurar a luva pela borda, com os dedos para baixo, mantendo o polegar à frente	

5	Preparar paciente	A)  B) 	A) Retirar toda a fixação do CVD cuidadosamente, evitando tracionar o cateter. B) Retirar a fralda descartável.
6	Realizar higiene íntima (paciente do sexo feminino)	A)  B)  C)  D)  E) 	Durante higiene íntima avaliar a integridade da pele: A) Higienizar a parte externa (região supra púbica e grandes lábios); com movimentos suaves de frente para trás (anteroposterior); B) Higienizar a parte interna (pequenos lábios): com movimentos suaves de frente para trás (anteroposterior); C) Higienizar a região anal; D) Com uma nova gaze/ compressa limpar a extensão da CVD em sentido unidirecional segurando a base do cateter; E) Enxaguar totalmente a região com água; F) Secar totalmente a região íntima com compressa, toalha seca ou lençol seco.
7	Fixar CVD e manter privacidade do paciente (paciente do sexo feminino)	A)  A1)  A2)  A3)  B)  C) 	A) Fixar a sonda na face interna da coxa, utilizando material padronizado na instituição (evitar esparadrapo) sem que haja tracionamento; Na utilização de micropore: A1 - Colar um pedaço de micropore sobre a pele do paciente; A2 - Realizar o meso sobre a sonda; A3 - Fixar o meso em cima do micropore já colado sobre a pele do paciente. B) Posicionar a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, 10 cm acima do nível do chão (no mínimo) e garantir o fluxo de urina livre. Rodiziar local de fixação conforme padronizado na instituição; C) Cobrir as partes íntimas do paciente conforme padronizado na instituição.

8	Retirar Luva de procedimento	A)  A)  B)  B) 	A) Segurar com a mão dominante a luva oposta pela palma da mão e puxar para frente; B) A seguir introduzir a outra mão por dentro da manga e puxar.
9	Higienizar as mãos	  Água e sabão Álcool gel	A) Higienizar as mãos após término do procedimento (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel).

	Dicas de Segurança
	PONTOS CHAVE!!