


Instrução de Processo		Setor	Validade
Realizar a higiene diária do meato uretral (Masculino)		Modelo	
Nº	O que fazer?	Imagem	Como fazer?
1	Higienizar as mãos	 <p>Água e sabão</p> <p>Álcool gel</p>	A) Higienizar as mãos imediatamente antes de higienizar a superfície que servirá de apoio, conforme padronizado na instituição (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel).
2	Reunir materiais	<p>A)</p>  <p>B)</p>  <p>Água e sabão</p> <p>Álcool gel</p> <p>C) e D)</p> 	<p>A) Higienizar a superfície que servirá de apoio para os materiais com produto padronizado;</p> <p>B) Higienizar as mãos imediatamente antes de tocar nos materiais, conforme padronizado na instituição (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel);</p> <p>C) Organizar todos os materiais que serão utilizados sobre a superfície de apoio;</p> <p>D) Deixar os materiais próximos ao paciente.</p>
3	Higienizar as mãos	 <p>Água e sabão</p> <p>Álcool gel</p>	A) Higienizar as mãos imediatamente antes de higienizar a superfície que servirá de apoio, conforme padronizado na instituição (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel).

4	Realizar paramentação	<p>A) </p> <p>B)   <b>Água e sabão</b>      <b>Álcool gel</b></p> <p>C) </p>	<p>A) Colocar máscara cirúrgica e óculos de proteção;</p> <p>B) Higienizar as mãos conforme padronizado na instituição (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel), imediatamente antes de calçar as luvas de procedimento;</p> <p>C) Com as mãos secas, calçar as luvas de procedimento. Segurar a luva pela borda, com os dedos para baixo, mantendo o polegar à frente.</p>
5	Preparar o paciente	<p>A) </p> <p>B) </p>	<p>A) Retirar toda a fixação do CVD cuidadosamente, evitando tracionar o cateter.</p> <p>B) Retirar a fralda descartável e posicionar a comadre.</p>

6

Realizar higiene  
Íntima  
(paciente do sexo  
masculino)

A)



B)



C)



D)



E)



F)



G)





H)



Durante higiene íntima avaliar a integridade da pele:

- A) Higienizar toda a base do pênis (região supra púbica e bolsa escrotal), com movimentos suaves de frente para trás (anteroposterior);
- B) Higienizar o corpo do pênis com movimentos unidirecionais da glândula para a base;
- C) Segurar o pênis, afastar o prepúcio e limpar toda a glândula com movimento circular e único;
- D) Com uma nova gaze/compressa. limpar a extensão do CVD em sentido unidirecional segurando a base do cateter;
- E) Realizar a higiene da região anal;
- F) Enxaguar totalmente a região com água limpa;
- G) Retirar a comadre;
- H) Secar totalmente a região íntima com compressa ou toalha seca

7	<p>Fixar CVD (paciente do sexo masculino)</p>	<p>A e A3)</p>  <p>A1)</p>  <p>A2)</p>  <p>B)</p>  <p>C)</p> 	<p>A) Fixar a sonda na região supra púbica ou inguinal, utilizando material padronizado na instituição (evitar esparadrapo) sem que haja tracionamento respeitando a anatomia do pênis do paciente;</p> <p><b>Na utilização de micropore:</b>  A1 - Colar um pedaço de micropore sobre a pele do paciente;  A2 - Realizar o meso sobre a sonda;  A3 - Fixar o meso em cima do micropore já colado sobre a pele do paciente;</p> <p>B) Posicionar a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, 10 cm acima do nível do chão (no mínimo) e garantir o fluxo de urina livre. Rodiziar local de fixação conforme padronizado na instituição;</p> <p>C) Cobrir as partes íntimas do paciente conforme padronizado na instituição.</p>
8	<p>Retirar Luva de procedimento</p>	<p>A)</p>  <p>A)</p>  <p>B)</p>  <p>B)</p> 	<p>A) Segurar com a mão dominante a luva oposta pela palma da mão e puxar para frente;</p> <p>B) A seguir introduzir a outra mão por dentro da manga e puxar.</p>

9	Higienizar as mãos	 Água e sabão	 Álcool gel	A) Higienizar as mãos após termino do procedimento (40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel).
---	--------------------	---	---	---

	Dicas de Segurança
	<b>PONTOS CHAVE!!</b>



