

Coleta dos Dados para o Cálculo dos Indicadores de Processo dos “Bundles” de Prevenção de PAV, IPCSL e ITU-AC

Bundles de Inserção de Cateteres Venosos ou Vesicais

1. Os itens de compõem os bundles de inserção de cateteres deverão **sempre ser coletados por observação direta (durante a inserção)**, utilizando-se o formulário específico para aquele tipo de cateter e registrando todos seus elementos. No caso de coleta por amostragem, deverá ser feito um rodízio entre os dias da semana e turnos de trabalho, lembrando sempre que um mínimo de 20 observações/mês deverão ser feitas. Os itens conformes serão marcados como “1” e os não conformes como “0”.

Sera considerado *checklist* aplicado ou itens do bundle de prevenção conformes somente quando forem observados no momento da inserção. Não considerar como aplicado ou conforme, caso o checklist seja preenchido fora do momento da inserção do CVC

Deve ser considerado como item cumprido (resposta SIM), mesmo se o profissional responsável pela inserção do CVC precisou ser lembrado ou orientado sobre o item/medida de prevenção do *checklist* antes de cumpri-lo

Abaixo, a sugestão da ANVISA para um Checklist de inserção de CVC

Ação Preventiva	Sim	Não
Higienizar as mãos		
Realizar a antisepsia da pele com gluconato de clorexidina $\geq 0,5\%$ ou PVPI alcóolico 10%.		
Esperar o antisséptico secar completamente antes de proceder à punção.		
Utilizar barreira máxima com: luvas, avental estéreis, gorro, máscara e óculos de proteção.		
Utilizar campo estéril que cubra todo o corpo do paciente (cabeça aos pés)		
Realizar curativo oclusivo estéril		

Observações para aplicação do *checklist*

- 1 – Deve ser aplicado em todos os turnos de trabalho do setor/unidade (manhã, tarde e noite).
- 2 – Pode ser aplicado por qualquer profissional da saúde que for treinado e envolvido no procedimento.

2. Se por qualquer razão algum dos elementos do bundle de inserção não puder ser observado no momento que estiver ocorrendo, será colocado um “X” naquele item. Novamente, importante enfatizar, que cada elemento do bundle deverá ter

pelo menos 20 observações/mês. Claro que quando ocorrer itens com “X”, serão necessários mais que 20 pacientes/mês para se completar pelo menos 20 dados por item do bundle por mês.

Bundles de Manutenção de Cateteres Venosos ou Vesicais

1. Também nos bundles de manutenção, **o ideal é a coleta de dados por observação direta** e de todos elementos em um mesmo paciente. Entretanto, durante a manutenção a observação direta poderá ser mais difícil, especialmente de todos os elementos do bundle em um mesmo paciente. Aqui também, os itens conformes serão marcados como “1” e os não conformes como “0”.
2. Registre os itens que foram observados diretamente. Complemente com análise do prontuário ou qualquer outra forma de registro ou entreviste quem está cuidando do paciente. Coloque um “X” nos elementos que não puderam ser verificados de nenhum modo. Aqui também, espera-se ao final do mês a coleta de pelo menos 20 registros para cada elemento do bundle.
3. Se algum elemento não se aplicar a aquele paciente ou estiver contra-indicado (situação pouco frequente), aquele elemento será considerado conforme e marcado com o numero 1.

Bundle de Prevenção de PAV

1. **Sempre que possível, colete os dados por observação direta**, registrando todos os elementos do bundle em um mesmo paciente. No caso de coleta por amostragem, deverá ser feito um rodízio entre os dias da semana e turnos de trabalho, lembrando sempre que um mínimo de 20 observações/mês deverão ser feitas. Os itens conformes serão marcados como “1” e os não conformes como “0”.
2. Quando houver dificuldade em se fazer observação direta de todos os elementos do bundle em um mesmo paciente, poderá ser utilizado a análise da documentação disponível (registro em prontuário ou formulário específico), ou entrevista com quem está cuidando do paciente. Espera-se que nestes

casos, as informações sejam as mais verdadeiras possíveis. Importante enfatizar, que um mínimo de 20 observações/mês se aplica a cada um dos elementos do bundle.

3. Quando não for possível se fazer o registro de todos os elementos em um mesmo paciente (seja por observação direta, documentação ou entrevistas), registrar o maior número de itens possíveis naquele paciente, colocando um "X" nos itens que não puderam ser observados ou coletados de outra forma. Novamente, importante enfatizar, que cada elemento do bundle deverá ter pelo menos 20 observações/mês. Claro que nesta última situação, serão necessários mais que 20 pacientes/mês para se ter 20 observações por elemento do bundle.
4. Se algum elemento do bundle não se aplicar ou estiver contra-indicado para um determinado paciente (situação incomum), aquele elemento será considerado conforme.

OBSERVAÇÃO:

Tratativa dos Indicadores de Processo

É importante que se colete os indicadores de processo (adesão aos bundles), pois a análise conjunta ou individual de cada um dos elementos dos bundles é uma importante ferramenta para nos guiar onde atuar para atingir melhores resultados

É necessário enfatizar que os indicadores de processo deverão ser sempre acompanhados em conjunto com os indicadores de resultado. Se ocorrer um cumprimento do bundle \geq a 95% e não se verificar melhoria do indicador de resultado ou ocorrer piora do indicador de resultado, isto pode significar o não cumprimento dos bundles ou falhas na medição dos seus elementos.