

FIP Desinfecção conexões - Sistema aberto

Processo: Desinfecção das conexões do cateter com sistema aberto

Materiais importantes/item principal envolvido: conexão do cateter

Outros Equipamentos e materiais: Swab de álcool / gaze com álcool, luvas de procedimento, tampa nova estéril para cateter

ETAPAS IMPORTANTES	PONTOS-CHAVES	RAZÕES
Qualquer segmento lógico que ajuda a avançar ou agrega valor ao processo	Qualquer coisa que poderá: 1. Aumentar o sucesso = qualidade 2. Segurança = evitar dano 3. Habilidade = técnica ou destreza especial para facilitar o processo (manha)	Razões lógicas para executar os pontos-chaves
1. Higienizar mãos	1. Conforme padronizado na instituição	1. Não levar contaminação para o paciente/ cateter
2. Calçar luvas	1. Secar bem as mãos 2. Segurar a luva pela borda, com os dedos para baixo, mantendo o polegar à frente	1. Facilitar calçamento da luva 2. Diminuir a contaminação da luva no calçamento
3. Abrir pacote da tampa e abrir álcool swab Ou Abrir a gaze e umedecer o material com álcool a 70%	1. Abrir em técnica estéril a tampa e abrir swab de álcool deixando os materiais próximos ao paciente Ou 1. Abrir em técnica estéril a tampa e gaze, 2. Não encostar a ponta do frasco na gaze 3. Quantidade que garanta que a gaze fique úmida.	1. Evitar contaminação da tampa / gaze e manter os materiais disponíveis para facilitar o processo Ou 1. Evitar a contaminação da tampa e da gaze. 2. Evitar a contaminação da gaze 3. Garantir o conteúdo alcoólico necessário para desinfecção
4. Fechar o cateter e retirar a tampa	1. Fechar a conexão do cateter 2. Segurar a ponta do cateter sem deixar que o mesmo encoste em qualquer superfície 3. Descartar a tampa	1. Não refluir sangue, evitar contaminação por material biológico 2. Evitar contaminação da ponta do cateter 3. Garantir que a tampa contaminada não seja reutilizada
5. Realizar Limpeza da conexão (ponta do cateter)	1. Limpar de maneira firme, com movimentos circulares envolvendo a ponta do cateter em direção única por 10 segundos ou (Contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005...1010)	1. Garantir a desinfecção em toda superfície da ponta do cateter, permitindo o tempo de ação do álcool.

	2. Repetir o processo de limpeza com novo swab / gaze se sujidade na ponta do cateter ou no swab / gaze utilizado.	2. Garantir que a ponta do cateter esteja limpa.
6. Tampar a conexão do cateter	1. Utilizar uma nova tampa estéril, segurando na parte externa da tampa	1. Evitar contaminação do cateter
7. Higienizar de Mãos	2. Conforme padronizado na instituição	2. 1. Não levar contaminação para o paciente/ cateter

1. Início:

2. Fim: