





| Instrução de trabalho | | Setor | Validade |
|----------------------------|--|---|--|
| Posicionamento Terapêutico | | Modelo | |
| nº | O que fazer? | Imagem | Como fazer? |
| 1 | Posicionamento do recém-nascido em decúbito ventral |  | <p>A) Posicionar o RN dentro do ninho, com flexão de quadril.</p> <p>B) Dispor um coxim de posicionamento sob a região abdominal e mamilar do RN (promovendo a flexão do quadril).</p> <p>C) Logo abaixo dos pés colocar um coxim de modo a manter um ângulo de 90° entre o pé e o tornozelo.</p> <p>D) Aproximar o ninho, se necessário dispor 2 coxins ao longo das laterais direita e esquerda do RN. Aproximar a mão perto do rosto.</p> <p>O recém-nascido está com a cabeça alinhada com o tronco e com as mãos livres. ◆</p> |
| 2 | Posicionamento do recém-nascido em decúbito dorsal |  | <p>A) Posicionar o RN dentro do ninho, dispor um coxim de posicionamento abaixo do pescoço (entre o lobo orelha e ombro), de modo a manter o pescoço em posição neutra.</p> <p>B) Dispor um coxim abaixo dos joelhos mantendo-os em flexão. C) Aproximar o ninho nas laterais do bebê, cuidando para não promover protusão exagerada dos ombros.</p> <p>O recém-nascido está com a cabeça alinhada com o tronco e com as mãos livres. ◆</p> |
| 3 | Posicionamento do recém-nascido em decúbito lateral |  | <p>A) Posicionar o RN com flexão de quadril, dentro do ninho, dispor um coxim de posicionamento abaixo do pescoço (entre o lobo orelha e ombro).</p> <p>B) Posicionar outro coxim ao longo da coluna e dispor outro coxim de posicionamento entre os membros inferiores do RN sem afastar as pernas do corpo.</p> <p>C) O coxim deve estender-se até região abdominal.</p> <p>O recém-nascido está com a cabeça alinhada com o tronco e com as mãos livres. ◆</p> |

| | |
|---|---------------------------|
|  | Dicas de Segurança |
| | PONTOS CHAVE!! |