


Nº	O que fazer?	Imagem	Como fazer?
1	Primeiro Curativo: Gaze e cobertura ESTÉRIL		<ul style="list-style-type: none"> Garantir que o profissional responsável pela inserção realize o primeiro curativo. Trocar o curativo em até 48h, caso tenha sangramento, umidade, descolamento ou sujidade realizar a troca imediatamente.
2	Curativo aderido totalmente à pele e inserção protegida		<ul style="list-style-type: none"> Manter o curativo limpo, seco, aderido totalmente à pele e a inserção protegida. Trocar o curativo se sinais de descolamento da pele, sujidade, umidade e presença de sangue. <p>Caso esteja com presença de sangue, recomenda-se realizar o próximo curativo com gaze e película estável e monitorá-lo nas próximas 48h</p>
3	Inserir data no próprio curativo		<ul style="list-style-type: none"> Inserir data no próprio curativo deixando o sitio de inserção visível. <p>Atentar à data de troca dos curativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Convencional (gaze e cobertura estável): em até 48h; Película transparente estável: em até 7 dias;
4	Proteger curativo durante o banho		<p>Proteger o curativo e as conexões do cateter com plástico (ou material impermeável) e fita adesiva para banho. Evitar molhar o curativo. Caso após o banho curativo esteja úmido é necessário realizar a troca do curativo.</p>
5	Sem presença de sinais flogísticos		<ul style="list-style-type: none"> Avaliar diariamente e em todos os turnos presença de sinais flogísticos na inserção, se presente, discutir e registrar a conduta a ser seguida. <p>Caso o curativo esteja com gaze e película estável, realizar a inspeção do sitio de inserção durante a troca do curativo.</p>

 **Pontos importantes**

