Instrução de Processo (IP)
Manutenção Sistema de Infusão (equipos e conectores)

SAÚDE em nossas mãos
atitudes que salvam vidas

Nº	O que fazer?	Imagem	Como fazer?
1	Inspecionar o sistema de infusão diariamente a cada manipulação		Verificar presença de sangue ou sujidade Realizar troca imediata do sistema: equipos, conectores e torneirinhas.
2	Datar circuitos		Colocar data nos equipos e conectores do CVC, e atentar-se para a validade dos mesmos.
3	Para infusão contínua		Trocar conectores e equipos a cada 96 horas.
4	Para infusão intermitente		Trocar equipos a cada 24 horas.
5	Para NPT		Trocar equipos e dispositivo complementar de NPT a cada bolsa.

Nº	O que fazer?	Imagem	Como fazer?
6	Para Propofol		Trocar equipo e dispositivo complementar de propofol a cada 12 horas ou conforme orientação fabricante.
7	Para hemoderivados		Descartar equipo de hemoderivado a cada uso.
8	Para monitorização hemodinâmica		Trocar equipo de monitorização hemodinâmica a cada 96 horas.
9	Minimizar desconexões do sistema		Evitar desconectar o sistema durante banho, mobilização.

Pontos importantes

Obs: registrar todas as trocas realizadas em prontuário.